



## Fajtatájékoztató

Gazdaságos hús- és tojástermelés Bábolnai baromfihibridekkel.

### Arbor Acres

#### Húshibrid naposcsibe

A BÁBOLNA ARBOR ACRES a világ legelterjedtebb húshibridje. Fehér tollazatú, nyugodt vérmérsékletű, igen jó húsformákat mutató, gyors fejlődésű hibrid.

Megfelelő tartós és intenzív takarmányozás esetén 6-7 hetes korra akár 2,0 - 2,5kg közötti vágási tömeget is elérnek, mindössze 4,4 - 6 kg takarmány felhasználásával, mely teljesítménnyel magasan kiemelkedik az eddig tartott fajták közül.

A kiváló növekedési erély kibontakoztatásához biztosítani kell az állatok részére a megfelelő takarmányt, ami legalább 20%-os nyersfehérjét tartalmaz.

### Bábolna TETRA-SL

#### Tojóhibrid naposjérce

A barna tollazatú, barna héjú tojást tojó BÁBOLNA TETRA-SL tojóhibridek hosszú ideje a világ élvonalába tartoznak.

Jó ellenálló képessége, nyugodt vérmérséklete, kiváló genetikai képessége gazdaságossá és jövedelmezővé teszi mind nagyüzemi, mind háztáji tartásukat.

Elsősorban nagy tételben, piaci tojástermelésre termelő megrendelőinknek ajánljuk ketreces vagy mélyalmos tartástechnológiához, de alkalmas kis mennyiségben, hagyományos baromfiudvarban történő tartás mellett a család tojásigényének ellátására is.

### Bábolna TETRA-H

#### Kettőshasznosítású naposcsibe

A BÁBOLNA TETRA-H (háztáji) hibrid színes tollazatú. A zsemleszín mellett előfordul benne többféle szín is a fehértől a búzabarnán keresztül a fekete farktollakig. Változatos színével a baromfiudvar "ékszerévé" válhat.

Nyugodt vérmérséklete, kiváló szervezeti szilárdsága, kedvező takarmányértékesítése, valamint a fenti értékből következő gazdaságos termelése révén a BÁBOLNA TETRA-H különösen alkalmas a háztáji gazdaságok "hagyományos-parlagityúkféléjének" leváltására.

A csibéket marek-féle vakcinával oltva, és fertőző bronchitis ellen vakcinázva forgalmazzuk.

### Bábolna HARCO

#### Háztáji naposcsibe

A BÁBOLNA HARCO fekete színű naposcsibe. A jércék tollazata döntően fekete marad, de a barna szín is előfordul főleg a mell és nyak környékén. Középnéhez testű, nagy ellenálló képességű, barna színű tojást termelő fajta.

A kakasok tollazata, a hazánkban kedvelt kendermagos. Szilárd szervezete, kedvező sárga bőrszíne, tartási körülményekre kevésbé érzékeny volta miatt kifejezetten háztáji tartásra javasoljuk. Külterjes viszonyok között is 12-14 hetes korára 1,6-1,7kg jó minőségű, ízletes leveshúst állít elő.

## Fontosabb termelési mutatók:

	TH	TSL	Harco
➤ Tojástermelés kezdete	21.-22.hét	19.-20.hét	20.-21.hét
➤ Kakasok testtömege 14 hetes korban	1,8-1,9kg	1,6-1,7kg	1,6-1,7kg
➤ Jércék testtömege a tojástermelés kezdetén	2,1-2,4kg	1,6-1,7kg	1,7-1,8kg
➤ Jércék testtömege a tojástermelés végén	2,8-3,2kg	2,0-2,1kg	2,2-2,4kg
➤ Tojástermelés 52 hét alatt	230-250db	300-312db	285-295db
➤ Átlagos tojástömeg	60 - 62g	64-65g	64-65g
➤ Napi takarmányfogyasztás a tojóidőszakban	125 - 135g	115-125g	120-125g

## Néhány tanács naposcsibék fogadásához

Naposcsibét telepíteni csak kellően előkészített férőhelyre ajánlatos. A telepítést megelőzően száraz, majd nedves takarítást kell végezni. Minden alkalommal alaposan ki kell fertőtleníteni. A helyiség mentes legyen kórokozóktól (baktériumok, penészgombák), mivel a fertőzöttség megnöveli a naposkori elhullást. Ezt követően végezhetjük a bealmozást nedvszívó anyaggal (szecskázott szalma vagy forgács).

Napos korban a csibék hőmérsékleti igénye magas. A problémamentes fejlődéshez feltétlenül 32 - 34 °C hőmérséklet szükséges az első napokban. Heti csökkenés 3 °C. A 4 - 5. héttől kezdődően a hőmérsékleti igény csökken, de még ekkor is szükséges a 20 -21 °C. Zárt tartás esetében az ammónia és egyéb káros gázok, ill. magas pára képződését szellőztetéssel kell megszüntetni.

Megfelelő tömeggyarapodás, illetőleg a későbbi tojástermelés érdekében, ha zárt, vagy félig zárt a tartás, az alábbi telepítési sűrűség javasolt:

- 1-10 hét: 1m<sup>2</sup> nevelési felületre 16-18 csibét telepíthetünk.
- 10 hetes kortól a kakasok kivágása esetén a megmaradó jércék részére nagyobb terület áll rendelkezésre, és így megvalósul ugyanazon férőhelyen 1 m<sup>2</sup>-re a kb. 8-10 db-os sűrűség.
- Tojóidőszakban, kezdetben 1m<sup>2</sup>-en 7-8 tyúk, későbbiekben 5-7 tyúk tartása ajánlott.

Gyakori, hogy háztáji baromfitartásban fele arányban tápot, fele arányban pedig szemes takarmányt, gabonadarát, vagy melléktermékeket etetnek. Az ilyen jellegű takarékos takarmányozás TETRA-H esetében megvalósítható, de az alábbiakra ügyelni kell:

Az első 3-4 héten lehetőség szerint csak tápot etessünk, és fokozatosan álljunk rá a gyengébb keverékre. Tojóidőszakban az ásványi anyagok, elsősorban mész pótlásáról gondoskodni kell, részben szemcsézett mészkővel, részben a kereskedelemben kapható ásványi kiegészítőkkel.

Hibridjeinkkel, és szaktanácsainkkal reméljük, hozzá tudunk járulni, hogy gazdaságában több eredményt érjen el. Sikeres csirkenevelést kívánunk Önnek.